

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 8-11-66 574354

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Seurre - BEAUNE.
C. C. P. : DIJON 3.405-19

25 F.

Bulletin n° 74 - NOVEMBRE 1966

7 NOVEMBRE 1966

UN INDESIRABLE AMATEUR DE FRUITS : LE LÉROT

Après s'être signalé plus ou moins ouvertement tout l'été dans diverses cultures, (maïs - petits pois), dans les vignes, les treilles et les vergers, pressentant les premiers froids, le lérot gagne les habitations. Chaque année à pareille époque, il se manifeste d'une façon particulièrement désagréable dans les greniers, les caves et les fruitiers, consommant maïs, noix et noisettes, pommes, poires et confitures. Si les quantités réellement consommées sont relativement infimes, par contre le gaspillage est considérable : des dizaines de fruits sont attaqués pour la consommation de quelques-uns.

Le lérot que l'on appelle dans la région improprement Loir rappelle l'écureuil dans ses poses et sa silhouette. Il mesure 12 à 15 cm avec une queue présentant un pinceau terminal un peu plus courte que le corps. Le dos est gris fauve à brun roussâtre et contraste nettement avec le ventre d'un gris très clair. Le museau court porte de belles moustaches très longues, noires ou blanches. Les oreilles sont grandes et droites, dégageant nettement les yeux gros et saillants. Ceux-ci sont entourés d'un cercle de pelage noir en forme de lunettes. Le Loir est gris uniforme et se rencontre dans les régions méridionales principalement.

Dans un nid aérien (arbres ou charpentes) il ne donne naissance habituellement qu'à une seule portée de 4 à 6 petits par an. Il hiverne ; dès les premiers froids, il s'engourdit jusqu'aux beaux jours.

C'est un grand consommateur de fruits de toutes sortes, aussi bien sur pied qu'au fruitier. Il est friand des oeufs de petits passeraux, de pain d'épice, de biscuit et surtout de lard.

La lutte contre ce petit rongeur particulièrement méfiant n'est pas facile ; elle demande de la patience et de la méthode.

Tout d'abord lui interdire l'entrée des locaux de conservation en fermant les portes de ceux-ci et en garnissant les soupiraux et les bouches d'aération de grillage fin.

Le piégeage peut être pratiqué sous deux formes pendant toute la belle saison :

- avec des pièges à palette (sans appât) que l'on tend sur les passages repérés (murs, grosses branches d'arbres, etc...),

- à l'aide de pièges à tapette (avec appât) que l'on utilise pour capturer les souris ; ce modèle est assez puissant pour le lérot, le piège à rat étant trop gros. Comme appât on choisit de préférence le lard mais aussi : pain d'épice, biscuit, noix, noisette, quartiers de pomme. Il faut varier le menu le plus possible et placer simultanément sur plusieurs pièges deux ou trois de ces appâts.

Enfin à l'entrée de l'hiver, il serait particulièrement recommandable de confectionner ou d'aménager des caissettes présentant un côté incomplètement clos (trou d'entrée). On dispose dans celle-ci vieux lainages. On les met en place dans des endroits calmes et abrités (greniers - remises - etc...). A l'approche des premiers froids, les lérots pénètrent dans les caisses pour leur hibernation. Il suffit de visiter ces abris bien avant le réchauffement de la température printanière et de détruire les rongeurs qui s'y trouvent.

P. 1459

La lutte par appâts empoisonnés peut être également intéressante, toutefois en raison des supports utilisés (pain d'épice, biscuit, fruits) il conviendra de prendre toutes précautions pour éviter des accidents vis à vis des enfants et des animaux domestiques.

Les produits anticoagulants classiques (habituellement utilisés contre les rats d'habitation) donnent des résultats irréguliers et incomplets. Une nouvelle formule à base de chlorophacinone sous forme de concentrat huileux (pour préparation d'appâts) serait susceptible d'être plus efficace ; elle mérite d'être expérimentée. Le support serait constitué par des fruits, pommes de préférence coupées en quartiers et trempées dans le concentrat. Des pommes entières peuvent aussi être injectées de produit. Actuellement cette formule est commercialisée sous deux appellations commerciales (voir ci-dessous).

La lutte contre les lérôts ne peut donc être entreprise qu'entre le réveil du printemps et l'entrée du sommeil hivernal, contrairement à ce qui est habituellement conseillé pour les rats d'habitation, les mulots et campagnols des champs.

Actuellement le piégeage (sous ses diverses formes) appliqué judicieusement et en temps opportun reste le moyen de destruction le plus sûr contre ce petit rongeur.

Nota.- Concentrats huileux à base de chlorophacinone actuellement en vente :

- CAID (concentrat huileux) LYPHA - 115, avenue Lacassagne - LYON (3e) - B.P. N° 106
- RATICIDE SAVIAC (concentrat huileux) - AULAGNE - 114, rue Duguesclin - B.P. N° 9
à VENISSIEUX.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.